


CLINIC®

Dés herbant foliaire systémique pour lutter contre les mauvaises herbes annuelles et vivaces

كلينيك®

مبيد عشبي جهازى لمقاومة الأعشاب الطفيلية المعمرة و الحولية



Composition : 360 g/l de glyphosate sous forme de sel d'isopropylamine

Formulation : Concentré soluble (SL)

Autorisation de vente N° : E12-2-003

PRESENTATION : CLINIC® est un herbicide systémique efficace contre la plupart des mauvaises herbes annuelles et vivaces.

MODE D'ACTION : CLINIC® pénètre dans les plantes à travers les feuilles et les parties vertes ou bois non aoûtés, touchés par l'application. Transporté en quelques heures par la sève jusqu'à l'extrémité des racines, CLINIC® détruit totalement les parties aériennes et souterraines des plantes vivaces. • CLINIC® n'est pas résiduel.

USAGES ET DOSES D'EMPLOI :

Agrumes : • mauvaises herbes cibles : dicotylédones et graminées annuelles et vivaces. 3l/ha pour les annuelles et 6 l/ha pour les vivaces. Appliquer CLINIC® quand les conditions de développement des adventices sont favorables (bon état de végétation)

Sans culture : • 3 l/ha sur jujubier à raison de 0,25 l/m². Appliquer CLINIC® en début de formation des drupes à maturité.
• La quantité de bouillie à utiliser est comprise entre 100 et 300 l/ha. Le pulvérisateur doit être muni de buse miroir ou à fente.
• L'emploi d'adjuvant peut être recommandé (consulter les distributeur).

Fève • mauvaises herbes cibles : Orobanche
• 167 cc/ha en deux applications espacées de 15 jours
• Appliquer CLINIC® en pleine floraison de la fève (début de germination de l'orobanche).

N.B. :

- N'appliquer la spécialité CLINIC® que quand les adventices sont en état très poussant
- Ne pas traiter s'il y a un risque de pluie dans les 6 heures qui suivent le traitement
- Eviter tout entraînement du produit, lors des traitements sur les cultures avoisinantes.
- Ne pas toucher lors des traitements les parties vertes ou les écorces non lignifiées des cultures.

PERIODE D'UTILISATION :

CLINIC® s'emploie du printemps à l'automne en tenant compte des remarques suivantes :

- L'efficacité est favorisée par une température poussante (> à 5°C) et une bonne hygrométrie lors du traitement. En période sèche et chaude, intervenir plutôt le matin ou en fin de journée.
- Pour la flore vivace (cas de chiendent et de liseron), il faut intervenir lorsque l'ensemble des parties aériennes est développé (afin d'assurer une meilleure systémie et toucher au mieux les organes souterrains).

PERSISTANCE D'ACTION :

- Les premiers symptômes apparaissent de 3 à 20 jours après le traitement. • Sur certaines espèces pérennes, dont les ligneux et semi ligneux, traités à l'automne, les premiers symptômes apparaissent au redémarrage de la végétation au printemps suivant.

PRECAUTIONS A PRENDRE :

Le manipulateur de la spécialité CLINIC® doit être obligatoirement muni de tous les moyens de protection (gants, tenue de protection, visière, chaussures adéquates, casque, etc.). Eviter tout contact avec les yeux et la peau : Produit irritant

Eviter d'inhalier le brouillard de pulvérisation. En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer les yeux pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation persistante, consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver toutes les parties contaminées y compris les cheveux avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste. En cas d'ingestion accidentelle, faire appel au médecin : pas d'antidote spécifique. En cas d'inhalation, amener la personne à l'air frais. En cas d'apparition de problèmes ou de maux respiratoires persistants, appeler un médecin. Ne pas traiter contre le vent afin d'éviter des expositions répétées et prolongées au brouillard de pulvérisation. Interdire l'accès à la parcelle traitée à toute personne non impliquée dans les opérations de traitement et aux enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de traitement et de manipulation de CLINIC®. En cas d'accident recouvrir la zone contaminée avec du sable et ou de la terre puis transférer dans un récipient pour récupération ou élimination. Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés avant leur réutilisation. Respecter les doses prescrites et les périodes d'application. Pour tous les mélanges avec d'autres produits, prendre contact avec la société concernée. Bien agiter le bidon contenant le CLINIC® avant l'emploi. Le matériel de traitement doit être en acier inoxydable, en aluminium, en fibre de verre, en plastique ou en acier recouvert de plastique. Les eaux de lavage et de rinçage ainsi que les restes de bouillies doivent être éliminés. Ils ne doivent en aucun cas contaminer les étangs, mares, cours d'eau, ni les points d'eau, les eaux naturelles et les égouts. Les emballages vides doivent être rendus inutilisables et enfouis dans le sol loin des cours et points d'eau. Tenir hors de la portée des enfants et des personnes non averties. En cas d'ingestion, d'un contact, ou d'un malaise, consulter un médecin ou contacter le centre anti-poison 27, Avenue Ibn Batouta, Rabat Tél.: 037 68 64 64.

IMPORTANT : Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d'origine ainsi que leur conformité à l'autorisation de vente du Ministère de l'Agriculture.

® Marque déposée Nufarm

Distributeur exclusif **AMAROC S.A.** 

152, Bd Abdellah Ben Yacine - 20300 Casablanca

Tél. : (0 5 22) 24.24.71 / 72 - Fax : (0 5 22) 24.44.53

E-Mail : contact@amaroc-agro.com

957135 - C07 - IMP. SIAL - 02 33 77 15 00

01731/. 0. 9/M?P



200 L لتر

Dangereux

خطير

Dangereux

التركيب : 360 غرام/ لتر غليفوساط على شكل ملح إزوبروبيلامين

رخصة البيع بالمغرب رقم : E12-2-003

التعريف : كلينيك مبيد عشبي جهازى لمقاومة الأعشاب الطفيلية المعمرة و الحولية.

طريقة الفاعلية : كلينيك سريع الإمتصاص عن طريق أوراق الأعشاب الطفيلية التي يتسرب منها و عن طريق الجزء الأخضر للنبته فيقضي تماما على العشب الضار.

الإستعمالات و المقادير :

- كمية الخليط الواجب استعمالها بين 100 إلى 300 لتر في الهكتار.
- من المحبذ استعمال مرش مزود براس عاكس (Buse miroir) أو مزود بفتحة (Buse à fente).
- 3 لترات في الهكتار ضد الأعشاب الضارة الحولية التي تكون حول أشجار الحوامض.
- 6 لترات في الهكتار ضد الأعشاب الضارة المعمرة التي تكون حول أشجار الحوامض.
- 3 لترات في الهكتار بنسبة ل0,25 لتر في متر للقضاء على السدره
- 167 ملل في الهكتار باستعمالين متباعدين بمدة 15 يوما ضد الأعشاب الضارة : شوال الخروف التي تكون حول الفول

فترات الإستعمال :

- تقع عملية المداواة عندما تكون الأعشاب الطفيلية في حالة نمو قصوي
- تكون فاعلية كلينيك أنجع عندما تكون الرطوبة مرتفعة و الحرارة تفوق الخمس درجات.
- عندما يكون الطقس حارا و جافا ، يرش المبيد عند الصباح أو عند نهاية اليوم.
- وقت إزهار الفول (بداية إنبات شوال الخروف)

احتياطات الإستعمال :

- تجنب رش المبيد على أوراق المغروسات اللينة و المزروعات الحساسة. • تجنب المداواة عند التنبؤ بنزول الأمطار خلال الأربعة و العشرين ساعة القادمة. • تجنبوا الرش عندما تكون الرياح. • يتوجب على مستعملي دواء كلينيك أن يلبسوا القفازات، القناع و جميع اللوازم الوقائية لتجنب ملامسة الدواء. • تجنبوا أي ملامسة بالأعين و الجلد. • في حالة ملامسة المبيد بالأعين و الجلد اغسلوا فوراً و جيداً بالماء و الصابون. • تجنبوا استنشاق ضباب الرش. • تجنبوا الأكل، الشرب و التدخين عند الإستعمال. • يجب التخلص مما تبقى من حساء المبيد دون أن تلوث مجاري المياه. • تجنب ابتلاع أو لمس المبيد، الإتصال بطبيب عند الشك في حالة تسمم اتصلوا بمركز ضد التسمم 27 شارع ابن بطوطة الرباط الهاتف : 037 68.64.64

هام

الصانع يضمن جودة مبيداته الموزعة في علبها الأصلية و المطابقة لرخصة البيع من طرف وزارة الفلاحة.

® ماركة مسجلة لشركة نيفارم

الموزع الوحيد : **أماروك ش.م** 

152 شارع عبد الله بن ياسين - 20300 الدار البيضاء

الهاتف : (05 22) 24.44.53 فاكس : (05 22) 24.24.71 / 72

Nufarm