

## PRESENTATION:

LANNATE® 20L est un insecticide de la famille des carbamates particulièrement actif sur larves de lépidoptères ainsi que sur insectes piqueurs-suceurs ou défoliants ; chenilles, pucerons, psylles, mouches blanches.

LANNATE® 20L est doué d'une efficacité de choc sur ces insectes, même adultes, ainsi que d'une action ovicide.

## DOSES D'EMPLOI :

Cultures	Ravageurs	Doses	DAR
Tomate, Poivron, Aubergine	Mouche blanche, Pucerons, noctuelles	150 à 250 cc/hl	3 jours ( sous serre)
Courgette	Pucerons	1,5 l/ha	7 jours plein champs
Asperge et Epinard	Pucerons et noctuelles	1,5 l/ha	
laitue	Mouche mineuse, Thrips, Pucerons, noctuelles	1,5 l/ha	14 jours
Pommier, Poirier	Carpocapse, Pucerons, mineuses	250 cc/hl	21 jours
Luzerne	Lépidoptères	250 cc/hl	-
Rosier	Pucerons	200 cc/hl	-
Cotonnier	Lépidoptères	250 cc/hl	-

N° de lot et date de fabrication :

Voir sur l'emballage

## PRECAUTIONS D'EMPLPOI:

Voir Interieur

Distribué exclusif

**AMAROC**

152, Bd Abdellah Ben Yacine - 20 300 Casablanca

Tél. : (05 22) 24.24.71/72 - (05 22) 40.90.14/15

Fax : (05 22) 24.44.53

Insecticide systémique  
des arbres fruitiers,  
des cultures maraîchères,  
fourragères et du coton

**DU PONT**

**Lannate® 20 L**  
de DuPont

مبيد حشري جهاززي لأشجار الفواكه،

الخضروات، الكلاً، القطن

Solution concentrée :

200 g/litre de methomyl

محلول مركز :

200 غرام /لتر من المطوميل

رخصة البيع: N° B02-7-005 Autorisation de vente

250 ml مللتر

## تعريف

لانيط 20 ل مبيد حشري من مجموعة الكاربمات له فعالية هامة ضد الديدان و الحشرات الماصة و الحفارة و الأرقا و البراغيت و الذباب الأبيض .

لانيط 20 ل له تأثير فوري فعال على كل هذه الحشرات حتى البالغة منها كما يبيد بيضها

## مقادير الاستعمال

المزروعات	الحشرات المخربة	مقاييس الإستعمال	فترة الأمان
طماطم، فلفل، باذنجان	الديابة البيضاء، المن، الذودة	150 إلى 250 سنتيم <sup>3</sup> /هكتار	3 أيام (للزراعات المحمية)
القرع	المن	1,5 لتر/هكتار	7 أيام (لزراعة الحقل)
السكوم، السيانغ	المن ، الذودة	1,5 لتر/هكتار	14 يوم
الخص	الديابة البيضاء، ترييس ،الذودة ،المن	1,5 لتر/هكتار	21 يوم
شجر التفاح و الإجاز	كاربوكيس ، المن ، الذودة	250 سنتيم <sup>3</sup> /هكتار	-
الكلاً	الذودة	250 سنتيم <sup>3</sup> /هكتار	-
الورد	المن	200 سنتيم <sup>3</sup> /هكتار	-
القطن	الذودة	250 سنتيم <sup>3</sup> /هكتار	-

أنظر بالداخل

موزع من طرف

**AMAROC**

152، شارع عبد الله بن ياسين-20300 الدار البيضاء،  
الهاتف : (05 22) 24 24 71/72 - (05 22) 40.90.14/15  
الفاكس : (05 22) 24 44 53

سسم



Poison

سسم



Poison



سسم



Poison

سسم



Poison

**MODE D'EMPLOI :** Par pulvérisation. Utiliser le produit aux doses indiquées dès que les insectes apparaissent.

**PREPARATION DE LA BOUILLIE :**

Remplir le réservoir du pulvérisateur au quart ou à la moitié, ajouter le LANNATE® 20L directement dans ce réservoir.

Mélanger soigneusement jusqu'à mise en suspension complète. une fois cette mise en suspension obtenue, il est utile de maintenir l'agitation. Finir le remplissage avec la quantité d'eau nécessaire.

**COMPATIBILITES :**

LANNATE® 20L est compatible avec la plupart des fongicides, acaricides et autres insecticides. les exceptions comprennent la bouillie bordelaise, la bouillie sulfocalcique et autres substances alcalines. **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :**



Tenir hors de la portée des enfants ■ Attention! LANNATE® 20L est toxique, par ingestion et inhalation

■ Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation ■ Ne pas respirer les aérosols (brouillards de pulvérisation) ■ Conserver le LANNATE®20L uniquement dans son emballage d'origine fermé, à l'écart des aliments et des boissons ■ Eviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements En cas de contact, se rincer abondamment à l'eau savonneuse, dans le cas des yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes et demander l'intervention d'un médecin. ■ Retirer tout vêtement contaminé et le laver avant sa réutilisation éventuelle. Porter un vêtement de protection, des gants, des lunettes de protection, un masque prévu pour la protection contre les aérosols ■ Attention! LANNATE® 20L est inflammable. Le conserver à l'abri de la chaleur, d'étincelles ou de flammes ■ Garder l'emballage fermé, le stocker en local aéré ■ Ne pas fumer ■ LANNATE® 20L est dangereux pour les abeilles, il ne doit pas être employé pendant la floraison

■ Produit toxique pour les poissons, et la faune sauvage ■ Eviter toute contamination des eaux de surface ou souterraines lors de la pulvérisation, ou par les eaux de rinçage ou en jetant les fonds de cuves ■ Eviter les mélanges avec les produits alcalins ■ Emballages vides : réemploi interdit. bien vider, rincer et brûler ou détruire.

**ANTIDOTE ET PREMIERS SOINS :**

L'atropine est un antidote. En cas d'urgence, se procurer des tablettes de 0,5 mg chacune auprès d'un médecin. Appeler immédiatement un médecin dans tous les cas d'intoxication présumée. Si le produit a été avalé, boire 1 à 2 verres d'eau et provoquer le vomissement en stimulant l'arrière gorge avec le doigt ou un objet émoussé. Ne jamais faire vomir ou essayer d'administrer quoi que ce soit par voie buccale à une personne inconsciente. Demander l'intervention d'un médecin. Si le produit a été inhalé, écarter la personne de la zone de contamination. l'allonger et la maintenir calme. Si elle ne respire plus, commencer immédiatement la respiration artificielle. Ne jamais rien donner par voie buccale à une personne inconsciente. Si les symptômes d'intoxication apparaissent, avant l'arrivée du médecin, avaler immédiatement 2 tablettes et demi d'atropine (0,5 mg chacune); ensuite toutes les 10 à 15 minutes, prendre une tablette d'atropine (0,5 mg) jusqu'à ce que la gorge soit sèche, et que la peau soit sèche et retrouve sa coloration normale. Si nécessaire, prendre d'autres tablettes afin de maintenir la gorge sèche, la peau sèche et de coloration normale jusqu'à l'arrivée du médecin.

**IMPORTANT :** L'empoisonnement au méthomyl produit des effets associés à l'activité anticholinestérase

**REMARQUE IMPORTANTE**

Respecter les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Conduisez sur ces bases, la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous facteurs particuliers concernant votre exploitation, tels que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, et variétés végétales, la résistance des espèces... Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d'origine ainsi que leur conformité à l'autorisation de vente du Ministère de l'Agriculture.

En cas de malaise, contacter le centre anti-poison Tél. : 037 68 64 64

Distribué par : 

152, Bd. Abdellah Ben Yacine - Casablanca 20300  
Tél.: 05 22 24.24.71/72 - Fax : 05 22 24 44 53

## كيفية الاستعمال

يستعمل المبيد بالمقادير الموضحة فور اكتشاف الحشرات ،كرر عملية الرش كل 5-7 أيام حسب درجة تفشي الافة حضر قبل الرش كمية كافية من المبيد المخلوط بالماء حتى تكون الوقاية منتظمة .

## تحضير محلول الرش

لانيط 20 ل مادة سائلة تذوب في الماء إملء خزان الرشاش لغاية نصفه و أضف إليه مباشرة مادة لانيط 20 ل، اخلط بعناية حتى يتكون خليط متجانس تماما ثم يضاف باقي كمية الماء اللازمة.

قابلية التوافق مع المبيدات الأخرى

لانيط 20 ل قابل للتوافق مع معظم المبيدات الحشرية ،القردية، الفطرية، باستثناء حساء البوردولي الحساءات السولفوكسسية و المواد الألكينية الأخرى.

## احتياطات الإستعمال

احفظه في مكان لا يصل إليه الأطفال ■ انذار : لانيط 20 ل مادة خطيرة عن طريق الطعام و الإستنشاق ■ تجنب الأكل و الشرب و التدخين أثناء الإستعمال ■ لا تشم الرذاذ الخارج من الرشاش ■ احفظ لانيط 20 ل فقط في علبته مغلوقة بعيدا عن الطعام و المشروبات ■ تجنب تلامس المبيد مع العين و البشرة و الملابس، إذا لمست المبيد اغسل الجزء الملوث جيدا بالماء و الصابون في حالة تلوث العين اغسلها جيدا بالماء لمدة 15 دقيقة والجأ فورا إلى الطبيب. ■ اعزل الثياب الملوثة بالمبيد و اغسلها جيدا قبل استعمالها مرة أخرى. ■ يجب لبس الثياب الواقية، القفازات، النظارات الواقية والقناع الواقي من الرذاذ ■ انذار! لانيط 20 ل قابل للإلتهاب يجب حفظه عن الحرارة و الشغل و تخزينه في مكان جيد التهوية. ■ عدم التدخين ■ لانيط 20 ل خطير للنحل، يجب ألايستخدم إبان الزهر ■ مادة سامة للسك و الحيوانات الوحشية ■ تجنب تلوث المياه السطحية و المياه الجوفية أثناء الرش عند تنظيف أجهزة الرش أو عند التخلص من المبيد المتبقي في قعر الخزان ■ العلب الفارغة : يمنع استعماله مرة أخرى افرغها جيدا اغسلها احرقها أو اعدمها فورا.



## الجرعة المضادة و الإسعافات الأولية

الأتروبيين هو الجرعة المضادة .إستشر طبيبا عند الطوارئ للحصول على كمية من أقراص الأتروبيين عيار ٠,٥ مليجرام. إذا ابتلع الإنسان المبيد يجب شرب كوب أو كويين من الماء ثم مساعدته على التقيء لملامسة باطن الحلق بالأصبع أو بأداة غير حادة . و في حالة غياب وعيه الحذر من محاولة دفعه إلى تقيء أي شيء عن طريق الفم كما يجب استدعاء الطبيب فورا .إذا استنشق المبيد ابعاد المصاب عن أي أثر للمبيد و تركه مستلقيا دون حركة وإذا كف المصاب عن التنفس يلزم مساعدته فورا بالتنفس الاصطناعي.لايجب أن يعطى للإنسان أي شيء عن طريق الفم وهو في حالة لاوعي.

إذا ظهرت أعراض التسمم قبل أن يصل الطبيب يجب أن يأخذ المصاب حالا قرصين و نصف قرص من الأتروبيين (كل قرص ٠,٥ مليجرام) وبعده ذلك يستمر في أخذ قرص واحد كل ١٠ أو ١٥ دقيقة إلى أن يصبح حلقه جاف و بشرته جافة و متوردة يجب الإستمرار في أخذ أقراص الأتروبيين محافظة على حلق جاف و بشرة جافة ريثما يصل الطبيب

• انذار : إن للتسمم بمادة المطوميل تأثيرا على نشاط أزييم الكولين إستراز.

## ملاحظات هامة

يجب احترام المقاييس ، الظروف و احتياطات الإستعمال المشار إليها على العلب و الناتجة عن اختصاصات المبيد و الإستعمالات الموصى عليها . يجب أن تكون زراعاتكم و المعالجات مطابقة للتقنيات الفلاحية الجيدة وأن تأخذوا بعين الإعتبار تحت مسؤوليتكم العوامل الخاصة بصيغيتكم منها نوع التربة، أحوال الطقس، أنواع النباتات، أصناف الحشرات المقاومة للمبيد ... الصانع يضمن جودة مبيداته الموزعة في علبها الأصلية و المطابقة لرخصة البيع من طرف وزارة الفلاحة.

حالة الطوارئ المرجو الإتصال بمركز ضد السم.

الهاتف : 0537 68 94 94

الموزع : **أماروك ش.م. سيمية**

152 شارع عبد الله بن ياسين – الدار البيضاء 20300

الهاتف : 05 22-40-90-14 - 05 22-24-24-71

الفاكس : 05 22-24-44-53