

5H4W/Y1/S/08
F/BVT 118486
DUPONT DE NEMOURS

UN 2757



6

N° de lot :

ATTENTION: DANGER POISON

TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS DANS UN ENDROIT SEC

PREMIERS SECOURS :

- En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment avec de l'eau pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau : laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Si l'irritation persiste consulter un médecin.
- En cas d'ingestion : boire 1 à 2 verres d'eau. Provoquer des vomissements. Appeler un médecin. Ne pas induire de vomissements ou faire avaler quelque chose à une personne inconsciente.
- En cas d'inhalation : transporter la personne contaminée dans une pièce fraîche et aérée et la laisser au repos. Appeler un médecin. En cas de difficulté respiratoire, administrer de l'oxygène. Si le patient ne respire plus commencer immédiatement la respiration artificielle et appeler un médecin.

NOTE AU MEDECIN :

SYMPTOMES D'INTOXICATION : L'empoisonnement au METHOMYL produit des effets associés à l'activité anticholinestérasique qui peuvent se manifester par une faiblesse, des troubles de la vue, des maux de tête, des nausées, des crampes abdominales, une sensation inconfortable dans la poitrine, une constriction des pupilles, une transpiration, un ralentissement du rythme cardiaque, des tremblements musculaires.

TRAITEMENT : Le sulfate d'atropine doit être utilisé pour le traitement. Administrer des doses répétées de 1,2-2,0 mg par voie intraveineuse toutes les 10 à 30 minutes jusqu'à complète atropinisation. Maintenir l'atropinisation jusqu'à ce que le patient soit remis. La respiration artificielle ou un apport d'oxygène peuvent être nécessaires. Ne pas réposer le patient à des inhibiteurs de cholinestérase jusqu'à son complet rétablissement. Ne pas utiliser de morphine ou de 2-PAM. Toutefois, en cas d'empoisonnement provoqué simultanément par le LANNATE et un insecticide organophosphoré, le 2-PAM peut être utilisé à nécessaire pour suppléer le traitement au sulfate d'atropine décrit plus haut.

EQUIPEMENT DE PROTECTION :

Pendant la préparation de la bouillie, le remplissage du pulvérisateur, l'application, le nettoyage du matériel et toute autre manipulation du produit, les utilisateurs doivent être équipés de vêtements de protection appropriés à savoir: un masque pour protéger les yeux, des gants, une longue chemise, un long pantalon, chaussures et chaussures. Laver les habits après utilisation.

Cultures	Insectes	Doses	Délais avant récolte
Tomate, poivron et aubergine	Mouche blanche, pucerons et noctuelles	180 à 200 g P.C./hl	7 jours plein champ et 3 jours sous serre
Concombre, melon et courgette	Mouche blanche et pucerons	120 g P.C./hl	
Asperge et épinard	Pucerons et noctuelles	120g P.C./hl	14 jours
Laitue	Mouche mineuse, thrips, pucerons, et noctuelles	120g P.C./hl	21 jours
Pommier et poirier	Carpocaps, pucerons et mineuses	200 à 300 g P.C./hl	21 jours
Pêcher	Pucerons	200 g P.C./hl	
Rosier	Pucerons	200 g P.C./hl	
Colombier	Lépidoptères	200 g P.C./hl	
Vigne	Tortueuse	1,6 kg P.C./hl	30 jours

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Seules les personnes équipées de vêtements de protection peuvent être présentes dans les zones à traiter.
- Eviter l'entraînement du brouillard de pulvérisation ou de poussières de produit sur les personnes manipulant le produit.
- Nettoyer soigneusement après manipulation.
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Conserver à l'écart des denrées alimentaires, des boissons et de la nourriture destinée aux animaux.
- Bien se laver les mains avant de manger, boire ou fumer.
- En cas de malaise, contacter le centre anti-poison - Tél. : 037 68 64 64.

RISQUES ECOLOGIQUES :

- Ce produit est toxique pour les poissons et la faune sauvage. Eviter toute contamination des eaux de surface ou souterraines lors de la préparation et de la pulvérisation de la bouillie, ou par les eaux de rinçage du matériel de traitement.
- Ce produit est toxique pour les abeilles. Traiter tôt le matin ou le soir lorsque l'activité de butinage est minimale.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION :

LANNATE est un insecticide du groupe des carbamates d'origine américaine (Du Pont de Nemours), doté de propriétés systémiques il agit également par contact sur de nombreux insectes. LANNATE est un produit à usage agricole professionnel uniquement à appliquer sur de nombreuses cultures légumières, fruitières et de plein champ.

Préparation de la bouillie - remplir le réservoir du pulvérisateur au quart ou à la moitié, ajouter le LANNATE directement dans ce réservoir. Mélanger soigneusement jusqu'à dissolution complète. Une fois cette dissolution obtenue, il est inutile de maintenir l'agitation. Finir le remplissage avec la quantité d'eau nécessaire. La bouillie ne doit pas passer la nuit dans la cuve ou autre réservoir.

Utiliser le produit aux doses recommandées dès que les insectes apparaissent. Continuer les traitements à un intervalle de 5 à 7 jours si nécessaire. Utiliser suffisamment d'eau afin d'obtenir une protection uniforme et totale. Utiliser les faibles doses sur des plantes peu développées, des chenilles de petites tailles ou une infestation d'insectes légers. Traiter une à trois fois aux doses les plus fortes recommandées pour le contrôle d'infestations sévères. Par la suite utiliser les doses faibles en traitement d'entretien.

COMPATIBILITE :

- Ne pas utiliser LANNATE avec la bouillie bordelaise, bouillie sulfacalcique ni avec des solutions hautement alcalines. Utiliser des bouillies moyennement alcalines immédiatement après le mélange, pour éviter la perte de l'activité de l'insecticide.

ENTREPOSAGE :

- Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit sec et bien aéré hors de la portée des enfants. Ne jamais entreposer à des températures inférieures à 0°C.
- Maintenir les emballages fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Conserver à l'écart des autres produits phytosanitaires, des engrais, des semences, des denrées alimentaires, des boissons et de la nourriture destinée aux animaux.

Emballages vides: rincer/interdit. Ne pas réutiliser les emballages vides. Enterrer ou brûler selon réglementations locales.

REMARQUE :

Les prescriptions d'emploi s'entendent pour les conditions normales d'utilisation. Elles ne constituent pas une règle absolue pour les cas particuliers qui ne peuvent relever que de l'expérience locale des utilisateurs. Notre responsabilité se limite à la fourniture de spécialités légalement autorisées à la vente par le Ministre de l'Agriculture et conformes à la formule indiquée.

AMAROC S.A.
 152, Bd Abdallah Ben Yacine, Casablanca
 Tél: 022 24 24 71 - Fax: 022 24 44 53
 info.amaroc@maroc-agro.com

Validité: 3 ans
 Poids net: 1 Kg

الصلاحية: ٣ سنوات
 الوزن الصافي: ١ كيلوغرام

الاستعمال:
 لايتب® 25 WP مبيد حشري من مجموعة الكاربامات جهازي من أصل اميريكي (دوبون دي نمورز) له فعالية على عدد كبير من الحشرات.

المزروعات	الحشرات الضارة	مقاييس الاستعمال	اخر اجل الاستعمال
طماطم، فلفل، النرجيل	الذبابة البيضاء والتمن والتوتكتويل	180 à 200 g P.C./hl	٧ ايام للزراعات الحقل
خيار، بنبخ، كرتبة	الذبابة البيضاء والتمن	120 g P.C./hl	٣ ايام للزراعات المحمية
سكوب، سبانخ	التمن وتوتكتويل	120 g P.C./hl	
الخض	الحفارات، ترييس، التمن، وتوتكتويل	120 g P.C./hl	١4 يوم
نقاع، إجناس	كاربوكيس، التمن، الحفارات	200 à 300 g P.C./hl	21 يوم
خوخ	التمن	200 g P.C./hl	21 يوم
ورد	التمن	200 g P.C./hl	
قطن	حرفشيات الأجنحة	200 g P.C./hl	
عنب	أوديسيس	1,6 kg P.C./hl	30 يوم

تحضير محلول الرش:
 يجب ملء خزان الرشاش لغاية ريعه أو نصفه من الماء أضف لايتب® 25 WP مباشرة ثم أخلطه بعناية حتى يتكون حساء متجانس تماما ثم يضاف باقي كمية الماء اللازمة. لا يجب تعب احتراق الرشاش إن يمكن طوال الليل في الخزان.

يجب احترام المقاييس واستعمال المبيد حتى ظهور الحشرات. يجب الرش كل ٥ إلى 7 أيام إن اقتضى الحال. استعمال الماء الكافي حتى تحصلوا على حساء متجانس.

هام جدا: قبل استعمال لايتب® 25 WP اقرأ بعناية والتبع بحرص شديد تعليمات الاستعمال وكل المعلومات الموجودة على بطاقة الاستعمال.

أجهزة الوقاية:
 عند عملية تحضير الحساء وملئ آلة الرش وإبان الرش وصل الآلات وكل العمليات التي لها علاقة بالمبيد يجب أن يكون المستخدم ملابص للوقاية بما في ذلك الثياب الواقية، النظارات الواقية والقناع الواقى من الرذاذ، يجب غسل الملابس بعد استعمالها.

اماروك ش.م.ج. ١52 شارع عبد الله بن ياسين - الدار البيضاء
 الهاتف: 022 24 24 71 - الفاكس: 022 24 44 53

سم **POISON** **سم** **POISON**



DU PONT

1 Kg

Lannate® 25 WP
Insecticide Poudre Mouillable

Nom Chimique: Méthomyl S-methyl-N-[(methylcarbamoyl)oxy]thioacetimidate
 Composition Matière Active: Méthomyl 25% Ingrédients Inertes 75%

دوبون

لايتب® 25 WP
مبيد حشري

ميظوميل: إس-حتيل-إن (ميتيلكاربامويل) أوكسي ثيوأستيميدات
 التركيب: المادة الفعالة: ميظوميل 25% المادة الجمادة: 75%

Déclaration de mise en vente A03-3-014
رخصة البيع رقم A03-3-014
انتباه: احتفظو بالمبيد بعيداً عن الأطفال في مكان جاف

خطر **سم**

المسغفات الأوفية

إذا ابتلع الإنسان المبيد يجب شرب كوب أو كوبين من الماء ثم مساعته على التقيؤ بمساعدة بطن الحلق بالإسراع أو بإداء غرغرة وفي حالة غيب وغيه الحذر من محاولة بلعه أو التقيؤ ولا تستعمل أي أداة عن طريق الفم. كما يجب ارتداء نظيب أورا
 العلاج يجب استعمال مقادير الأتروبين العلاج أعين المسبب مع ثياب متعاقبة مغزاة فا ١ إلى ٢ مليلتر أو في الأوبه مرآكل
 الاستعاضة لا تسمى أي انسان في حالة الأوبه أي سيرة عن طريق الفم
 إذا ظهرت أعراض التسمم (عثر الأعراس) أنه يجب عوون إرتدادات الطبيب) قبل أن يمثل الطبيب يجب أن يندد التسمم حيا
 فرسين وبعد أربعين من الأتروبين (كل فرس 2,5 مليلتر) أو بعد ذلك بفترة من ١٥ إلى ١0 في 15 دقيقة أو في
 يسمح حلقة جاف وشرائه جفة وممتدرة (يجب الإستمرا في أخذ فرانس الأتروبين المتعاقبة على فتر جاف وشره جافة وممتدرة)
 ريثما يصل الطبيب.

® Marque déposée de Du Pont de Nemours



02-02-71 K-20026/20808 - MOROCCO

سم **POISON** **سم** **POISON**