

# Insecticide pyréthriinoïde polyvalent



**BULLDOCK**<sup>®</sup>  
025



- Action par contact et par ingestion
- Bonne action de choc
- Longue rémanence



Bayer CropScience

## Insecticide pyréthriinoïde polyvalent

مبيد الحشرات بيريتريينويد متعدد الإستعمال

### Présentation :

- Composition : 25 g/l Beta-Cyfluthrine
- Famille chimique : Pyréthriinoïdes de synthèse
- Formulation : Suspension concentrée (SC)
- Homologation N° E02-3-002

### Spectre d'action :

**Bulldock** est une spécialité insecticide recommandée particulièrement pour la lutte contre les ravageurs de la betterave à sucre (casside), les chenilles de la tomate (héliothis) et le carpocapse du pommier.

### Mode d'action :

**Bulldock** est un nouvel insecticide Pyréthriinoïde à action renforcée grâce à l'effet optimisé de sa matière active, la Beta-cyfluthrine.

Grâce à son action essentiellement par contact et par ingestions et à son effet de choc, **Bulldock** offre une rapidité d'action ainsi qu'une longue rémanence.

**Bulldock** offre une flexibilité d'emploi et montre une bonne tolérance vis-à-vis des cultures traitées.

Pour la gestion de la résistance, il est recommandé d'alterner l'usage du **Bulldock** avec des produits de familles chimiques différentes.

### Epoque d'application :

**Bulldock** doit être utilisé préventivement dès l'apparition des premières attaques des insectes.

### Doses d'emploi :

Cultures	Ravageurs	Doses	DAR
Betterave à sucre	Casside	150 cc/ha	21 jours
Pommier	Carpocapse	50 cc/hl	14 jours
Tomate	Noctuelles	50 cc/hl	3 jours

### تقديم :

التركيبية: 25 غرام/لتر بيطاسيفلوترين

الفئة الكيميائية: بيريتريينويد

الصياغة: محلول مركز (SC)

رقم التسجيل: E02-3-002

### مجال التأثير:

يوصى باستعمال **بيلدوك** خصوصا ضد الحشرات الضارة في زراعة الشمندر السكري ضد الدود في زراعة الطماطم و ضد الكاربوكابس في أشجار التفاح.

### طريقة التأثير:

**بيلدوك** مبيد جديد ينتمي إلى العائلة الكيميائية البريتريينويد ذو فعالية مدعمة و ذلك بفضل احتوائه على المادة الفعالة (البيطاسيفلوترين) بفضل تأثيره عن طريق اللمس والتناول و سرعة فعاليته فإن **بيلدوك** يوفرتأثير سريع ومدة فعالية طويلة يتميز أيضا **بيلدوك** بمرونة في الإستعمال و بانتقائية على الزراعات المداواة.

### فترة الاستعمال :

يجب استعمال **بيلدوك** وقائيا عند ظهور الأعراض الأولى للإصابة بالحشرات.

### مقادير الإستعمال :

الزراعات	الحشرات	المقادير	فترة الأمان
الشمندر السكري	كاسيد	150 ملل/ هكتار	21 أيام
التفاح	كاربوكابس	50 ملل/ هكتار	14 أيام
الطماطم	الدود الليلي	50 ملل/ هكتار	3 أيام



Bayer CropScience

Bayer CropScience  
Tours Balzac Angle Bd d'Anfa & Rue de l'Épargne  
20 050 Casablanca - Maroc  
Tél. : +212 22 95 48 30/24  
Fax : +212 22 39 23 79  
www.bayercropscience.ma

Distribué par : **AMAROC** شركة

152, Bd Abdallah Ben Yacine

20 300 Casablanca

Tel.: (022) 24.24.71/72 - (022) 40.90.14/15