

Pilori® 480 EC

La Polyvalence insecticide



Pilori® 480 EC

Avantages

- Haut niveau d'efficacité
- Régularité d'action
- Triple mode d'action
 - Contact, Inhalation, Ingestion
 - Polyvalence cultures : Agrumes, arboriculture fruitière, grandes cultures
- Large spectre d'action : Cochenilles, Thrips, Noctuelles, Carpocapse, Tordeuse, Pou de sain josé, Cicadelle...
- Longue persistance d'action
- Neutre à faiblement toxique sur les typhlodromes
- Compatibilité avec la plupart des pesticides
- Substance inscrite dans l'annexe 1 de la directive Européenne 91/ 414

Doses et usages autorisés

Cultures	Ravageurs	Doses	D.A.R
Agrumes	Cochenilles	150 cc/hl	45 jours
Pommier	Carpocapse	125 cc/hl	30 jours
Betterave à sucre	Casside	0,75 L/ha	21 jours

Recommandations d'utilisation



Cochenilles :

Pilori® 480 EC est hautement efficace sur toutes les espèces de cochenilles s'attaquant aux agrumes, dont les plus importantes au Maroc

- Pou de californie (*Aonidiella auranti*), Cochenille serpette (*Lepidosophes glowerii*), Cochenille violette (*parlataria pergandii*), Cochenille virgule (*Lepidosahes bekii*); ainsi que les autres cochenilles, Pou rouge -pou noir - pou de lierre-cochenille noir cochenille australienne - Cochenille blanche et la cochenille plate.

Période :

- Intervenir sur la génération Avril - Juin dès que le maximum du stade sensible (+ de 50%) est atteint ; L1,L2 et jeunes femelles, avant la formation du bouclier.
- Assurer un bon mouillage y compris la face inférieure.
- Adapter le réglage du pulvérisateur en conséquence.



Carpocapse du pommier :

Intervenir dès l'application des premières attaques quand le seuil de nuisibilité est atteint.



Casside de la betterave sucrière :

Raisonner les traitements suivant l'activité de la casside, au repérage de retour des adultes hivernants.

Précautions d'emploi

Conditions climatiques :

Il est préférable de traiter sur un feuillage sec, mais avec une bonne hygrométrie et en l'absence de vent.

Préparation de la bouillie :

Remplir à moitié d'eau la cuve du pulvérisateur et mettre en marche l'agitation. Après avoir agité le bidon, verser Pilori® 480 EC dans la cuve. Compléter le remplissage et maintenir l'agitation pendant la durée du traitement.

Utiliser la bouillie immédiatement et totalement après préparation

et ne jamais laisser de fond de cuve.

Dans le cadre de bonnes pratiques agricoles, rincer 3 fois les emballages et verser l'eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur.

Mélanges :

Pilori® 480 EC est compatible avec la majorité des pesticides.

Il est préférable de réaliser un test de compatibilité au préalable.

Nous consulter.

Réglementation

Composition : 480g/l chlorpyriphos-ethyl

Formulation : Emulsion concentré -EC

Autorisation N°: E07-9-007

Toxicité : Tableau A

**Pilori® 480 EC est toxique pour les abeilles :
Traitement interdit pendant la floraison**

Importé et Distribué :

Amaroc S.A.

152, Bd. Abdallah Ben Yacine

Casablanca, 20300

Tel.: 05 22 24 24 71/72

Fax : 05 22 24 44 53

www.amaroc-agro.com